

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa giai đoạn đòng- trổ

Vụ Đông Xuân 2023-2024, toàn thị xã gieo cấy khoảng 1.660ha lúa. Đến nay, lúa đại trà đang giai đoạn làm đòng, một số diện tích gieo sớm bắt đầu trổ, nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển khá tốt. Các đối tượng sinh vật gây hại trên đồng ruộng như: Sâu cuốn lá nhỏ đang giai đoạn tuổi 5- trưởng thành (bướm), mật độ phổ biến 5-7 con/m², cục bộ một số diện tích ruộng xanh tốt mật độ sâu cao 10- 15 con/m²; Bệnh khô vằn gây hại khoảng 150 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10-20%; Chuột gây hại khoảng 100ha, tỷ lệ 3-5%, cục bộ nơi cao 5-10%. Các đối tượng sâu bệnh khác như rầy các loại, bệnh đốm nâu,... gây hại rải rác, mật độ và tỷ lệ hại thấp.

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đặc biệt không để bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các HTXNN thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện một số biện pháp sau:

1. Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên tất cả các giống khi lúa chạy về thừa (trổ 3- 5%) và phun lần 2 khi lúa vừa trổ xong (Sau lần một khoảng 7- 8 ngày) bằng các loại thuốc như Beam 75WP, Beamy-Kasu 300SC, Vibimzol 75WP, BemGreen 750WP,... kết hợp với thuốc phòng bệnh lem lép hạt như Tilt-Super 300EC, Sagograin 300EC, GolTil super 300EC, BreTil super 300EC, AmistarTop 325SC,...

2. Sâu cuốn lá nhỏ sẽ nở từ ngày 28/3- 04/4/2024, cần theo dõi thời gian sâu nở để phun trừ khi sâu cuối tuổi 1- đầu tuổi 2 trên diện tích có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên bằng các loại thuốc như Dylan 2EC, Virtako 40WG, Chetsau 100WG, Comda gold 5WG, Map Winner 5WG,... Đối với diện tích trà muộn phun lại lần 2 sau lần 1 khoảng 3- 4 ngày.

3. Đối với bệnh khô vằn: Phun trừ khi bệnh mới chớm phát sinh, nhất là trên các chân ruộng gieo sạ dày, thấp trũng, tù đọng nước,... bằng các loại thuốc như Validacin 5L, Vivadamy 5WP, Saizole 5SL, Vivil 5SC, Nevo 330EC, ... kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ hạn chế bệnh lây lan.

4. Đối với chuột: Giai đoạn lúa làm đòng- trổ chuột sẽ gây hại gia tăng, và chủ yếu cắn phá nên ưu tiên sử dụng các loại bẫy kẹp, bẫy lồng sẽ hiệu quả hơn sử dụng thuốc hoá học.

5. Đối với rầy nâu: Hiện nay mật độ rầy trên đồng ruộng rất thấp chưa cần phải phòng trừ bằng thuốc hoá học (không được phối trộn, kết hợp thuốc trừ rầy với thuốc phòng trừ đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ phun ở giai đoạn này). Tuy nhiên không nên chủ

quan, cần kiểm tra theo dõi chặt chẽ diễn biến trên đồng ruộng, nhất là trên các giống nhiễm rầy (Nếp, HT1, Khang dân,...), các vùng bị rầy gây hại nặng hàng năm để chủ động phun trừ kịp thời khi rầy gây hại với mật độ từ 1.500 con/m² trở lên bằng các loại thuốc như Chess 50WG, Cheestar 50WG, Sagometro 50WG,...

Lưu ý: Điều tiết nước hợp lý vào giai đoạn lúa làm đòng-trở, tránh để ruộng khô nước. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”. Sau khi phun trừ 3- 4 ngày kiểm tra kết quả phun trừ nếu sâu bệnh tiếp tục phát triển, hoặc sau phun gặp mưa dông cần tiến hành phun lại lần 2. Thu gom bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng và để đúng nơi quy định góp phần bảo vệ môi trường.

Trên đây là một số đối tượng sâu bệnh chính gây hại trên cây lúa giai đoạn đòng trở, đề nghị UBND các phường, xã, các HTXNN tập trung chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời góp phần bảo vệ năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023- 2024./.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV;
- UBND thị xã;
- Đ/c Nguyễn Việt Hà- PCT;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm VHHTT&TT;
- UBND các xã, phường;
- Các HTXNN;
- CB BVTV, KN của TT;
- Lưu.

(B/cáo)

(P/hợp)

GIÁM ĐỐC

Đoàn Phước Lễ